



# BUDIDAYA *Stenotaphrum Secundatum* UNTUK TERNAK RUMINANSIA



Tabel kecernaan *Stenotaphrum secundatum* yang diberikan kepada kambing kacang di dataran rendah beriklim basah Sei Putih.

Uraian	Taraf naungan		
	N-0%	N-55%	N-75%
Bahan Kering (%)	56.8	60.59	60.73
Protein Kasar (%)	56.75	61.48	56.54
Energi (%)	74.26	72.25	69.40
Bahan Organik (%)	64.28	57.48	67.49
NDF (%)	66.29	72.43	70.28
ADF (%)	64.57	67.20	68.46

Tabel Nilai Nutrisi rumput *Stenotaphrum secundatum* pada naungan berbeda

Uraian	Taraf naungan		
	N-0%	N-55%	N-75%
Bahan Kering (%)	11.12	14.89	12.90
Bahan Organik (%)	86.62	65.91	87.47
Kadar Abu (%)	13.38	34.09	12.53
Nitrogen (%)	1.34	1.42	1.40
Protein Kasar (%)	8.38	8.88	8.75
Energi (K.Kal/kg BK)	4816	4389	4071
NDF (%)	82.62	89.79	85.23
ADF (%)	64.16	62.14	60.65

Panen paksa perlu dilakukan yakni pada saat tanaman rumput berumur 2 bulan. Selanjutnya panen rumput dapat dilakukan setiap 45 hari pada musim hujan dan setiap 60 hari pada musim kemarau. Produksi bahan kering sebanyak 5 ton/ha/tahun.